



สถานการณ์ ณ สิ้นปี 2562
โดยการคาดประมาณ



ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี
471,061 คน

- เด็ก (< 15 ปี) 3,342 คน
- ผู้ใหญ่ (≥ 15 ปี) 467,719 คน
- ผู้หญิง 208,263 คน
- ผู้ชาย 262,798 คน



ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
5,446 คน/ปี

- เด็ก (< 15 ปี) 66 คน
- ผู้ใหญ่ (≥ 15 ปี) 5,380 คน
- ผู้หญิง 1,635 คน
- ผู้ชาย 3,811 คน

อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จาก
แม่สู่ลูก เท่ากับ 1.97 %



ผู้เสียชีวิตจากเอดส์
13,937 คน/ปี

- เด็ก (< 15 ปี) 160 คน
- ผู้ใหญ่ (≥ 15 ปี) 13,777 คน
- ผู้หญิง 6,489 คน
- ผู้ชาย 7,448 คน




ทัศนคติเชิงลบต่อ
ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี
58.6%

จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนปี 2557


สถานการณ์เอชไอวีประเทศไทย

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตจากเอดส์รายปี ถึงสิ้นปี 2562




การติดเชื้อรายใหม่ ร้อยละ 50
ของประเทศ เกิดในพื้นที่ 10 จังหวัด
ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี
นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครราชสีมา
ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย
และพิษณุโลก

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำแนกกลุ่มอายุ



ช่องทางการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่

- การติดเชื้อรายใหม่ 97% เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โดยเกิดระหว่าง
 - เพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย 49%
 - เพศสัมพันธ์จากการซื้อยาบริการ 5%
 - คู่นอนชั่วคราวและนอกสมรส 13%
 - คู่ผลเลือดต่าง (คู่อุยกิน/คู่ประจำ) 30%
- 3% ติดเชื้อ จากการฉีดสารเสพติดที่ไม่ปลอดภัย (Needle sharing)



ผลการสำรวจความชุกการติดเชื้อเอชไอวี

กลุ่มประชากรเป้าหมาย	ความชุก (%)	ปีที่สำรวจ
หญิงที่มาฝากครรภ์	0.4%	2562
ชายได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ	0.6%	2561
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)	11.9%	2561
หญิงข้ามเพศ (TGW)	11%	2561
พนักงานบริการชาย (MSW)	3.8%	2561
พนักงานบริการหญิง (FSW)	0.7%	2561
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID)	20.5%	2557

แหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยา และผลการเฝ้าระวัง จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค





ความก้าวหน้าการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ปี 2562

ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

81.7% ของเยาวชนชาย ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

78.9% ของเยาวชนหญิง ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

จำนวนผู้ใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ก่อนสัมผัสเชื้อหรือยา PrEP 6,985 คน

97.2% ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก

ความครอบคลุมการเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกในประชากรหลัก

กลุ่มประชากร	จำนวน (คน)	ร้อยละ*
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	104,591	66.3%
หญิงข้ามเพศ	12,273	19.6%
พนักงานบริการชาย	7,935	30.1%
พนักงานบริการหญิง	34,868	27%
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด	10,431	24.5%

* ร้อยละของจำนวนประชากรเป้าหมาย

ด้านการดูแลรักษา



จำนวนผู้รับบริการตรวจเลือดเอชไอวีและรู้ผลตรวจจำนวน 1,240,680 คน เป็นกลุ่มประชากรหลัก 152,851 คน

99% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี รู้ว่าตนเองติดเชื้อ

80% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ ได้รับยาต้านไวรัส

97% ของผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับยาต้านไวรัส กดไวรัสสำเร็จ

ด้านการลงทุนงบประมาณสำหรับเอดส์ ปี 2562

ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านเอดส์ ปี 2562 รวม 9,268 ล้านบาท

92% ของค่าใช้จ่ายด้านเอดส์ทั้งหมด มาจากงบประมาณภายในประเทศ

13% ของงบประมาณภายในประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกัน

ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันสำหรับประชากรหลักเป็นเงิน 240 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันทั้งหมด



ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์: hivhub.ddc.moph.go.th โทร. 0 2590 3828

จัดทำโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

